

Mischungszusammensetzung

1. Mischung mit besonderer Eignung für Sandstandorte (LJ Sand):

- 45 % Hafer
 - 25 % Buchweizen
 - 10 % Sonnenblumen
 - 7 % Markstammkohl
 - 5 % Senf
 - 5 % Futterraps
 - 3 % Ölrettich
- Saatstärke 10 kg/ha

2. Mischung mit besonderer Eignung für bessere Böden (LJ Lehm):

- 35 % Luzerne
 - 25 % Buchweizen
 - 16 % Markstammkohl
 - 12 % Senf
 - 8 % Futterraps
 - 4 % Ölrettich
- Saatstärke 8 kg/ha

3. Mischung mit besonderer Eignung für Schneisen (LJ Schneise):

- 70 % Serradella
 - 30 % Perserklee
- Saatstärke 8 kg/ha



Überreicht durch:

Landesjägerschaft
Niedersachsen e.V.
Telefon 0511 . 53043-0
www.ljn.de

AGRAVIS Raiffeisen AG
Telefon 0511 . 8075-3215
www.agravis.de

Landesjägerschaft Niedersachsen
Wildacker-Mischungen





Wildäcker haben einen hohen ökologischen Nutzen. Mit ihrer artenreichen Vegetation bilden sie nicht nur für unser heimisches Wild einen attraktiven Lebensraum, sondern auch für viele andere Tiere – von wichtigen Insektenarten bis hin zur seltenen Zauneidechse. In Zeiten, in denen die Kulturlandschaft zunehmend artenärmer

wird, sind Wildäcker eine wertvolle Maßnahme, dem Wild ganzjährig ein attraktives Nahrungsangebot zu bieten. Um einen artenreichen Wildacker zu erreichen, gilt es einiges zu beachten. Zu berücksichtigen sind vor allem die Bodenbeschaffenheit und die Saadmischung: Die Landesjägerschaft Niedersachsen hat verschiedene Saadmischungen in der Praxis erprobt und drei Mischungen für unterschiedliche Anforderungen



zusammengestellt: Für Sandböden (LJ Sand), für Böden mit besserer Qualität (LJ Lehm) und speziell für die Anlage von Schneisen (LJ Schneise). Die Ergebnisse für alle drei Saadmischungen waren sehr überzeugend sowohl im Hinblick auf die Vegetation als auch auf die Attraktivität für die Tierwelt.



Vorbereitung

Vor der Anlage eines Wildackers gilt: Sind auf der zu bearbeitenden Fläche hartnäckige Wurzelunkräuter wie Quecke, Distel, Ackerwinde oder ähnliches vorhanden, ist eine Herbizid-Vorbehandlung mit einem Glyphosat in voller Aufwandmenge erforderlich. Nach der vorgeschriebenen Wartezeit (je nach verwendetem Produkt kann sie zwischen 7 und 14 Tagen liegen) kann bei trockenen Bodenverhältnissen mit der Bodenbearbeitung begonnen werden.

Um das Saatbett bestmöglich zu bereiten, muss die Fläche zunächst gepflügt oder mit einem Schwergrubber bearbeitet werden; dies dient der Auflockerung des Bodens. Im Anschluss findet eine Rückverfestigung mit einem Feingrubber statt. Wird die Saat mit einer Kreiselege-Drillmaschine ausgeführt, geschieht die Rückverfestigung unmittelbar vor der Einsaat in einem Arbeitsschritt.

Einsaat

Die Einsaat erfolgt Ende April/Mitte Mai. Folgende Saatstärken werden von der Landesjägerschaft empfohlen:

Für die Mischung LJ Sand 10 kg/ha
 Für die Mischung LJ Lehm 8 kg/ha
 Für die Mischung LJ Schneise 8 kg/ha

Diese Saatstärken sollten nicht überschritten werden, da zu dichte Pflanzenbestände vom Wild nur ungern angenommen werden. Zudem können sich bei lockerer Einsaat auch natürliche Wildkräuter ansiedeln, die die Attraktivität des Wildackers zusätzlich steigern. Die Schneisenmischung sollte bei Beikrautüberwuchs geschröpft werden.

Wildackerflächen sollten grundsätzlich ein-, höchstens zweijährig sein – Flächen die längere Zeit einseitig als Wildacker genutzt werden, enthalten ein hohes Potenzial an Samen von Schadpflanzen. Das Anlegen eines Wildackers sollte möglichst im Wechsel mit konventionellen Ackerbaukulturen erfolgen. Folgende Kombinationen sind im Rahmen einer ackerbaulichen Fruchtfolge empfehlenswert:

1. Jahr	Wildackermischung Ansaat	Wildackermischung Ansaat	Mais/Getreide
2. Jahr	Mais/Getreide	Bestand vom Vorjahr bleibt	Wildackermischung Ansaat
3. Jahr	Wildackermischung Ansaat	Mais/Getreide	Bestand vom Vorjahr bleibt
4. Jahr	Bestand vom Vorjahr bleibt	Wildackermischung Ansaat	Mais

Das Hudern und Trockenlaufen zählt zum Komfortverhalten des Niederwildes. Wir empfehlen deshalb, das Saatgut in Streifen und zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahreslauf zu säen, damit dem Wild ausreichend Gelegenheit gegeben wird, diesem Verhalten nachzukommen.

Bis Mitte August eingesät bietet sich die Wildackermischung auch hervorragend als Zwischenfrucht nach Getreide oder Raps an.

Düngung

Für die Jugendentwicklung und spätere Blühphase der Pflanzen ist eine Düngergabe zur Saat vorteilhaft, mögliche Düngervarianten sind:

Volldünger 12-12-17-2 3 dt/ha
 Kalkammonsalpeter 1,5 dt/ha
 plus P/K Mischdünger 2–3 dt/ha
 Gülledüngung 10 m³/ha

Sollte eine Gülledüngung geplant sein, muss diese vor der Bodenbearbeitung ausgebracht werden.

Blühstreifen

Die Wildackermischungen eignen sich auch ideal zur Einsaat von Blühstreifen, die im Rahmen von Verpflichtungen des Niedersächsischen und Bremer Agrar-Umweltprogramms (NAU/BAU) angelegt werden müssen (Codierung 591 bzw. 592). In diesen Fällen sind die entsprechenden Cross Compliance (CC) relevanten Vertragsverpflichtungen hinsichtlich Düngung, Pflanzenschutz und Anbauzeit zu beachten. Blühstreifen sollten aus Wildschutzgründen möglichst nicht in Straßennähe angebracht werden. Um einer Verunkrautung vorzubeugen empfiehlt es sich außerdem alle 2 Jahre den Standort zu wechseln.

